

מבחן סוף באלגברה לינארית א למדעי המחשב

סמסטר קיץ התשע"ז מועד ב

יום ד יא כסלו התשע"ח 29-11-2017

- מורה : גיורא דולה, מתרגל : רענן שכטר.
- משך המבחן הוא שלוש שעות.
- ללא חומר עזר-מותרים מחשבונים
- התשובות לכל השאלות תכתבנה במחברות.
- הציון המקסימלי במבחן הוא 100 .
- עליך לענות על 11 שאלות ב-4 חלקים.
- בחלק הראשון 7 שאלות במשקל של 10 נקודות כל אחת. עליך לבחור 6 מתוך 7 שאלות שה"כ 60 נקודות בחלק הראשון.
- בחלק השני 4 שאלות במשקל של 5 נקודות כל אחת. בכל תשובה כזו יש לסמן במעגל את האופציה הנכונה, ולהוסיף נמוק קצר. הסימון והנמוק יהיו בשאלון. אם התשובה היא כן יש לתת נמוק קצר. אם התשובה היא לא מספיקה דוגמא נגדית. שה"כ 20 נקודות בחלק השני.
- בחלק השלישי שאלת נסוח והוכחה אחת בת משקל של 20 נקודות
- $60+20+20=100$

בהצלחה.

שאלה 1 (10 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z = 1 \\ 4x - 2y - 3z = 4 \\ 3x - 6y + 2z = -3 \end{cases}$$

מעל השדה מודולו שבע Z_7 .

א. חשב את המטריצה ההפוכה של מטריצת המקדמים.

ב. חשב את הפתרון של המערכת.

שאלה 2 (10 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 2x + (b-2)y + 3z = 2b \\ 4x + by + 4z = 3b + 2 \\ 6x + 4y + (2b+1)z = 17 \end{cases}$$

פתור את המערכת במחברתך ומצא במחברתך עבור אלו ערכים של b למערכת יש אינסוף פתרונות, אף פתרון או פתרון יחיד.

שאלה 3 (10 נקודות)

נתונה A_n מטריצה רבועית $n \times n$ המוגדרת על ידי

$$A_{i,j} = \begin{cases} -2 & j=i & 1 \leq i \leq n \\ 4 & j=i+1 & 1 \leq i \leq n-1 \\ 1 & j=i-1 & 2 \leq i \leq n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- א. כתוב את המטריצות המתאימות עבור $n=1,2,3,4,5,6$.
- ב. מצא קשר בין $\det(A_n)$ ובין הדטרמיננטים של מטריצות בעלות ממד יותר נמוך וכתוב נוסחת נסיגה עבור $\det(A_n)$.
- ג. מצא את $\det(A_n)$ כפונקציה מפורשת של n .
- ד. פתור את המשוואה $Av=0$.

שאלה 4 (10 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1+i)x + (2+i)y + (2+i)z = 1+i \\ (4+i)x + (3+3i)z = 4+i \\ (6+i)x + (2+2i)z = 3 \end{array} \right.$$

מעל שדה המרוכבים.

א. חשב את הדטרמיננט של מטריצת המקדמים.

ב. חשב את רכיב z של הפתרון של המערכת.

שאלה 5 (10 נקודות)

$$\frac{(1+i)^{30}}{(1-i)^{20}} \quad \text{א. חשב את}$$

ב. מצא במחברתך את כל המטריצות A אשר מקימות את המשוואה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} A = A \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

שאלה 6 (10 נקודות)

נתונה מטריצה A מסדר 3×3 ונתון כי $a_{1,1} = 1, a_{1,2} = 3, a_{1,3} = 5$ וכי

$$A^* = \begin{pmatrix} -12 & 24 & -12 \\ 24 & -48 & 24 \\ -12 & 24 & -12 \end{pmatrix}$$

מצא את כל המטריצות האפשריות A . המקיימות את הנתונים.

שאלה 7 (10 נקודות)

חשב את הדטרמיננט של המטריצה A המוגדרת להלן:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d^2 \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^4 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^6 \end{pmatrix}$$

חלק ב

בחלק זה ארבע שאלות בנות 5 נקודות כל אחת. עליך להקיף את התשובה הנכונה בכל שאלה ולתת נמוק קצר לתשובתך. הנמוק יכתב בשאלון. כל השאלות הן שאלות חובה. אם התשובה היא כן יש לתת נמוק קצר. אם התשובה היא לא מספיקה דוגמא נגדית.

שאלה 8 (5 נקודות)

נתונה מטריצה A מסדר $3n \times 3n$. נביט על העמודה שהיא סכום עמודות המטריצה אשר האינדקס שלהם מתחלק ב-3. נביט על העמודה אשר היא סכום עמודות המטריצה שהאינדקס שלהן לא מתחלק ב-3. נתון שעמודות הסכום הללו שוות. אז $\det(A) = 0$

לא נכון

נכון

נמוק קצר

שאלה 9 (5 נקודות)

נתונה מטריצה A מסדר $n \times n$. אז $\det(A^*A) > 0$

לא נכון

נכון

נמוק קצר

שאלה 10 (5 נקודות)

נתונות מטריצות A, B מסדר $n \times n$. אז $\det(A+B) > \det(A) + \det(B)$

לא נכון

נכון

נמוק קצר

שאלה 11 (5 נקודות)

נתונה מטריצה A מסדר $n \times n$. אז $\text{adj}(-A) = -\text{adj}(A)$

לא נכון

נכון

נמוק קצר

חלק ג

שאלה 12 (20 נקודות)

א. הוכח כי עבור כל \mathbb{Z}_n הוא חוג מתחלף עם יחידה.

ב. הוכח כי עבור \mathbb{Z}_n ראשוני הוא שדה.

מותר להשתמש בטענות עזר שהוכחנו בכתה, בתנאי שתנסח אותן במדויק בנפרד
מההוכחה.

פתרונות
תשובה 1

עמותה רשומה 580242451

ביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה ע"ש עמי וטדי שגיא

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{S_1 - 2S_3 \rightarrow S_1 \\ S_2 + 2S_3 \rightarrow S_2}} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 10 & 7 & 8 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 1 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{S_1 - S_2 \rightarrow S_1 \\ -2S_2 + S_3 \rightarrow S_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 5 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$\xrightarrow{\substack{S_2 - 3S_1 \rightarrow S_2 \\ 3S_1 + S_3 \rightarrow S_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 4 & 0 \\ 7 & 1 & 0 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_2 \leftrightarrow S_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 4 & 0 \\ 7 & 1 & 0 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

ו נוכל לפתר את המערכת : $AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ואכן

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & b-2 & 3 & 2b \\ 4 & b & 4 & 3b+2 \\ 6 & 4 & 2b+1 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow[S_2-2S_1 \rightarrow S_2]{S_3-3S_1 \rightarrow S_3} \begin{pmatrix} 2 & b-2 & 3 & 2b \\ 0 & 4-b & -2 & 2-b \\ 0 & 10-3b & 2b-8 & 17-6b \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_3+(b-4)S_2 \rightarrow S_3} \begin{pmatrix} 2 & b-2 & 3 & 2b \\ 0 & 4-b & -2 & 2-b \\ 0 & A & 0 & B \end{pmatrix}.$$

$$A = 10 - 3b + (b-4)(4-b) = 10 - 3b - b^2 + 8b - 16 =$$

$$= -b^2 + 5b - 6 = -(b-3)(b-2), B = (2-b)(b-4) + (17-6b) =$$

$$= -b^2 + 6b - 8 + 17 - 6b = -b^2 + 9 = (3-b)(3+b)$$

עבור $b=3$ למערכת יש אינסוף פתרונות. $b=2$ אין פתרון עבור כל b אחר למערכת יש פתרון יחיד.

תשובה 3

עמותה רשומה 580242451

ביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה ע"ש עמי וטדי שגיא

$$A_6 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{n+1}) &= -2 \det(A_n) - 4 \det(A_{n-1}) = \\ &= (-2)(-2 \det(A_{n-1}) - 4 \det(A_{n-2})) - 4 \det(A_{n-1}) = \\ &= 8 \det(A_{n-2}), \det(A_1) = -2, \det(A_2) = 0, \det(A_3) = 8 \end{aligned}$$

נשים לב כי
ולכן נקבל

$$\det(A_n) = \begin{cases} 0 & n = 3k + 2 \\ 8^k & n = 3k \\ (-2)8^k & n = 3k + 1 \end{cases}$$

ה. עבור $n \equiv 2 \pmod{3}$ הפתרון היחיד הוא וקטור ה-0. עבור $n \equiv 2 \pmod{3}$ הפתרון הוא וקטור מהצורה

$$(8^k, 4 \cdot 8^{k-1}, 0, -8^{k-1}, -4 \cdot 8^{k-2}, 0, 8^{k-2}, 4 \cdot 8^{k-3}, 0, \dots)$$

תשובה 4

א. נפתח את הדטרמיננט לפי עמודה אמצעית ונקבל:

$$\begin{aligned}\det(A) &= -(2+i)[(2+2i)(4+i) - (3+3i)(6+i)] = \\ &= -(2+i)(1+i)(8+2i-18-3i) = \\ &= (2+i)(10+i)(1+i).\end{aligned}$$

ב. נציב את וקטור האיברים החפשיים בעמודה השמאלית, נקבל את המטריצה A_y , ושוב נחשב את הדטרמיננט שלה לפי העמודה הימנית ושוב נקבל:

$$\begin{aligned}\det(A_z) &= -(2+i)[3(4+i) - (4+i)(6+i)] = \\ &= -(2+i)(12+3i - (24+10i-1)) = \\ &= -(2+i)(-11-7i) = (11+7i)(2+i).\end{aligned}$$

ולכן:

$$\begin{aligned} z &= \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{(2+i)(11+7i)}{(2+i)(1+i)(10+i)} \\ &= \frac{11+7i}{9+11i} = \frac{(11+7i)(9-11i)}{81+121} = \\ &= \frac{(99+77) + (63-121)i}{202} = \frac{176-58i}{202} \\ &= \frac{78-29i}{101} \end{aligned}$$

כדרוש.

תשובה 5 א פתרון א

$$\begin{aligned} \frac{(1+i)^{30}}{(1-i)^{20}} &= \left[\frac{(1+i)^3}{(1-i)^2} \right]^{10} = \left[\frac{1+3\cdot i-3-i}{1-2i-1} \right]^{10} = \\ &= \left[\frac{2\cdot i-2}{-2i} \right]^{10} = \left[\frac{i-1}{-i} \right]^{10} = \left[\frac{(i-1)\cdot i}{-i\cdot i} \right]^{10} = \\ &= [-(1+i)]^{10} = (1+i)^{10} = (\sqrt{2}cis(45))^{10} = \\ &= 512cis(450) = 512cis(90) = 512i \end{aligned}$$

תשובה 5 א פתרון ב

$$\begin{aligned} \frac{(1+i)^{30}}{(1-i)^{20}} &= \left[\frac{(\sqrt{2}cis(45))^3}{(\sqrt{2}cis(-45))^2} \right]^{10} = \\ &= \left[\frac{\sqrt{8}cis(135)}{\sqrt{4}cis(-90)} \right]^{10} = [\sqrt{2}cis(225)]^{10} = \\ &= 2^5 cis(180+45)^{10} = 512cis(450) = \\ &= 512cis(90) = 512i \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2b + 3c & d + 2e + 3f \\ 2b + 6c & 2e + 6f \\ b + 2c & e + 2f \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a & 2a + 4d \\ 3b & 2b + 4e \\ 3c & 2c + 4f \end{pmatrix}$$

מהשוואת המטריצות נקבל 6 משוואות עם 6 נעלמים.

מהמקומות (1,1),(2,1),(3,1) נקבל את 3 המשוואות:

$$a + 2b + 3c = 3a \rightarrow 2b + 3c = 2a$$

$$2b + 6c = 3b \rightarrow -3c = 2b \rightarrow c = 0$$

$$b + 2c = 3c \rightarrow b = c$$

$$\rightarrow 2b = 2c, 2b = -3c \rightarrow b = c = a = 0$$

ולכן נציב ונקבל:

580242451 עמותה רשומה

ביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה ע"ש עמי וטדי שגיא

$$d + 2e + 3f = 2a + 4d = 4d \rightarrow 3d = 2e + 3f$$

$$2e + 6f = 2b + 4e = 4e \rightarrow 2e = 6f \rightarrow e = 3f$$

$$e + 2f = 2c + 4f = 4f \rightarrow e = 2f$$

$$\rightarrow 3f = 2f \rightarrow f = 0 \rightarrow e = 0 \rightarrow d = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ . לכן הפתרון היחיד הוא המטריצה}$$

תשובה 6

נסמן

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ x & y & z \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

נשתמש בנתונים ונקבל משוואות

$$A^* = \begin{pmatrix} -12 & 24 & -12 \\ 24 & -48 & 24 \\ -12 & 24 & -12 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ x & y & z \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

$$c - 5a = -48 \rightarrow c = 5a - 48$$

$$3a - b = 24 \rightarrow b = 3a - 24$$

$$5x - z = 24 \rightarrow z = 5x - 24$$

$$y - 3x = -12 \rightarrow y = 3x - 12$$

$$cy - bz = -12 \rightarrow$$

$$(5a - 48)(3x - 12) - (3a - 24)(5x - 24) =$$

$$= -60a - 144x + 576 - (-72a - 120x + 576)$$

$$= 12a - 24x = -12 \rightarrow a - 2x = -1 \rightarrow a = 2x - 1$$

ונקבל

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ x & 3x-12 & 5x-24 \\ 2x-1 & 6x-27 & 10x-53 \end{pmatrix}$$

תשובה 7

נתונה המטריצה A ונפעל עליה פעולות יסודיות

$$\begin{aligned} & \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d^2 \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^4 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^6 \end{pmatrix} \xrightarrow[S_4 - a^3 S_1 \rightarrow S_4]{S_2 - a S_1 \rightarrow S_2, S_3 - a^2 S_1 \rightarrow S_3} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a & d^2-a \\ 0 & b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^4-a^2 \\ 0 & b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^6-a^3 \end{pmatrix} = \\ & = \det \begin{pmatrix} b-a & c-a & d^2-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^4-a^2 \\ b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^6-a^3 \end{pmatrix} \\ & = (b-a)(c-a)(d^2-a) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+a & c+a & d^2+a \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 & d^4+ad^2+a^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_3 - c_1 \rightarrow c_3]{c_2 - c_1 \rightarrow c_2} \\ & = (b-a)(c-a)(d^2-a) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b+a & c-b & d^2-b \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ac-ab-b^2 & d^4+ad^2-ab-b^2 \end{pmatrix} = \\ & = (b-a)(c-a)(d^2-a)(c-b)(d^2-b) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a+b+c & a+b+d^2 \end{pmatrix} = \\ & = (b-a)(c-a)(d^2-a)(c-b)(d^2-b)(d^2-c) \end{aligned}$$

נכון. נובע כי מטריצה A מסדר $c_3 + c_6 + \dots + c_{3n} = c_1 + c_2 + c_4 + c_5 + \dots + c_{3n-1}$ אז
 $c_1 + c_2 + c_4 + c_5 - \dots - c_3 - c_6 - \dots - c_{3n}$ היא פעולה אשר שומרת על הדטרמיננט של A ויוצרת
עמודת 0, ולכן הדטרמיננט של המטריצה החדשה, וגם של המקורית הוא 0.

תשובה 9

לא נכון אם איננה A איננה הפיכה אז $\det(A) = \det(A^2) = 0$

תשובה 10

לא נכון דוגמא נגדית $A = B = -I_3 \rightarrow A + B = -2I_3, \det(A + B) = -8 < \det(A) + \det(B) = -2$

תשובה 11

לא נכון אם A מסדר איזוגי אז כל אחד מהזאטוטים שלה מסדר זוגי וכפל כל שורה
במינוס נותן אותו דטרמיננט ולא מינוס הדטרמיננט.